

MESURES ADDITIONNELLES A PRENDRE CHEZ LES PATIENTS NEUTROPENIQUES



Définition de la neutropénie : granulocytes neutrophiles $< 0.5 \text{ G/l}$ ($< 500/\text{mm}^3$) ou $< 1.0 \text{ G/l}$ ($< 1000/\text{mm}^3$) avec chute prévue du taux à $\leq 0.5 \text{ G/l}$

Les patients neutropéniques sont à haut risque de complications infectieuses graves en raison de leur incapacité à se défendre normalement.

Les précautions ci-après sont destinées à prévenir aussi bien les infections dues aux micro-organismes dont le patient est déjà porteur que celles dues aux micro-organismes qu'il pourrait acquérir à l'hôpital

Placement du patient	Surblouse et désinfection des mains	Alimentation	Hygiène corporelle du patient Sur O/M (pour neutropénie de longue durée)	Transport du patient
<p>chambre individuelle</p>				
<p>Chambre individuelle (à pression positive si possible)</p> <p>Pas de plantes ni de fleurs</p>	<p>Désinfection des mains et surblouse non stérile à l'entrée dans la chambre</p>	<p>Régime spécial pour neutropénie</p> <p>Excluant certains produits susceptibles d'être contaminés par des agents infectieux, p.ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Crudités ➤ Viandes ou poissons insuffisamment cuits ➤ Fromage, etc... 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Toilette ou douche quotidienne avec un savon désinfectant ➤ Désinfection de la zone péri-anales par lavage et par application d'une pommade désinfectante 2x/j et après chaque selle ➤ Désinfection nasale avec une pommade ad hoc 4x/j ➤ Désinfection de la bouche par gargarismes et/ou comprimés à sucer 6x/j Cf. protocole spécifique 	<p>Limité aux besoins essentiels</p> <p>Mettre un masque chirurgical au patient</p> <p>Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</p>



Renoncer à entrer dans la chambre en cas de rhume, toux, angine etc. Si indispensable, **masque chirurgical**